

学会誌訂正のお知らせ

「日本ヘリコバクター学会誌 Vol.16 No.2」20 ページにおきまして誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

表 1 *H. pylori* 感染の内視鏡診断

【正】I. 通常観察

2) 現感染、既感染に共通な所見

- ・ヒダの腫大および蛇行(体部大彎)([図 2-A](#))

5) 未感染に特徴的な所見

- ・細く平行な縦走ヒダ(体部大彎)([図 2-B](#))

II. 色素観察

1) 現感染、既感染に共通な所見

- ・胃小区腫大(前庭部、胃角部、体部小彎)([図 2-C](#))
- ・胃小区間溝による網目状模様(前庭部、体部小彎)([図 2-C](#))

2) 既感染に多いが現感染でも観られる所見

- ・不整形の陥凹性発赤(前庭部、胃角部、体部小彎)([図 2-D](#))

3) 未感染に多いが既感染でも観られる所見

- ・細かいひび割れ模様([図 2-E](#))

4) 未感染に特徴的な所見

- ・平滑な粘膜(前庭部)([図 2-F](#))

【誤】

I. 通常観察

2) 現感染、既感染に共通な所見

- ・ヒダの腫大および蛇行(体部大彎)([図 3-A](#))

5) 未感染に特徴的な所見

- ・細く平行な縦走ヒダ(体部大彎)([図 3-B](#))

II. 色素観察

1) 現感染、既感染に共通な所見

- ・胃小区腫大(前庭部、胃角部、体部小彎)([図 3-C](#))
- ・胃小区間溝による網目状模様(前庭部、体部小彎)([図 3-C](#))

2) 既感染に多いが現感染でも観られる所見

- ・不整形の陥凹性発赤(前庭部、胃角部、体部小彎)([図 3-D](#))

3) 未感染に多いが既感染でも観られる所見

- ・細かいひび割れ模様([図 3-E](#))

4) 未感染に特徴的な所見

- ・平滑な粘膜(前庭部)([図 3-F](#))

学会誌訂正のお知らせ

「日本ヘリコバクター学会誌 Vol.16 No.2」111 ページにおきまして誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

社会保険委員会 須藤弘之 先生

【正】

福井大学 医学部 第二内科・地域高度医療推進講座

【誤】

福井大学 医学部 第二外科・地域高度医療推進講座